

●**デルティバ**(大塚錠)：50mg.

【警告】1.耐性菌の発現に注意：

→専門医又はその指導で投与、
会社のプログラムに登録した
医師・薬剤師、登録患者が使用。

2. QT延長に注意：

→投与開始前及び投与中は
心電図を定期的に検査。

【特】a.抗酸菌に特異的なミコール酸の
合成阻害剤、

b.既存抗結核薬と交叉耐性なし。

【効】多剤耐性肺結核

【用】1回100mgを1日2回朝、夕食後。
(空腹時は避ける)。

a.耐性菌防止のため：

抗結核薬3剤以上に、上乗せ併用。

(2ヵ月併用で菌陰性化45%、プラセボ
29%)

b.最大：継続で6箇月。

【体内動態】a.4時間でピーク、
半減期は25～29時間。

10日で初回濃度の2倍で定常状態。

b.空腹服用時Cmax53%に低下。

高脂肪食で濃度は2倍以上。

c.便へ53～75%、尿中へ0%。

【禁】妊婦又は妊娠の可能性。

【慎】1.次はQT延長に注意：

- ・ 著明な徐脈
- ・ 低K血症、低Mg血症、低Ca血症。
- ・ 心疾患
- ・ 先天性QT延長症候群等→悪化。
- ・ QT延長を起こす薬剤→377頁。
- ・ 低K血症を起こす薬剤→954頁。
- ・ 肝機能障害(血中濃度上昇のため)
- ・ 低アルブミン血症

2.高齢。

【患】授乳しない。

【副】52%**A.重大**：●QT延長7%：

D. ●めまい5%、●頭痛10%、●傾眠6%、
●不眠12%、動悸、房室ブロック、期外収縮、
高血圧、低血圧、錯感覚、不安、振戦、感
覚鈍麻、嗜眠、末梢性ニューロパチー、
平衡障害、不快感、リビドー亢進、激越、
うつ病、精神障害、●悪心5%、●嘔吐5%、
●腹痛5%、胃炎、腹部不快感、食欲不振、
消化不良、下痢、食欲亢進、味覚異常、貧
血、赤血球↑、白血球減、好酸球↑、肝機
能異常、高ビリルビン血症、発疹、そう
痒、ざ瘡、多汗、皮膚炎、蕁麻疹、脱毛、ほて
り、耳鳴、無力症、関節痛、筋痛、高尿酸血
症、低K血症、コルチゾール↑、呼吸困
難、耳痛、眼痛、霧視、屈折障害、倦怠感、胸
部不快感、胸痛、側腹部痛、四肢痛、口腔
咽頭痛、咯血、コルチゾール低下。