

INSTI

ドルテグラビルNa Dolutegravir Sodium

● **デビケイ** (ウィーブヘルスケア, GSK)

錠：50mg

[特] a. プースターを用いる必要がない。

b. インテグララーゼ阻害薬耐性に用いる

[効] HIV 感染症：

必ず他のHIV薬と併用。

[用] a. 1日1回50mg.

b. インテグララーゼ阻害薬に耐性：

1日2回50mg.

c. 年齢 $\geq$ 12歳, 体重 $\geq$ 40kgの小児：

1日1回50mg.

d. 食事の有無に関わらず投与。

[注] B型又はC型肝炎ウイルス感染時

→肝機能悪化に注意

[体内動態] a. 血中濃度は3時間に

ピーク, 半減期は14.7時間。

b. 糞便中へ53%, 尿へ1%未満排泄

[併] 主にUGT1A1, CYP3A4で代謝。

OCT2, MATE1を阻害。

B. 慎： a. ビルシカイニド, メトホルミン

の血中濃度上昇(OCT2及びMATE1

阻害)→心室頻拍, 洞停止, 心室細動等。

b. エトラピリン, エファビレンツ, ネビ

ラピン, ホスアンブレナビル/リトナ

ビル, フェニトイン, フェノバルビ

タル, カルバマゼピン, セイヨウオ

トギリソウ, リファンピシシで血

中濃度低下(CYP3A4, UGT1A1誘導)。

c. Mg, Al等含有製剤, 鉄剤, Ca含有製剤

(サプリメント等)で血中濃度低下

→本剤は2時間前又は6時間後に投与。

[副] 33%) **A. 重大**：薬剤性過敏症候。**D.** 添付文書参照。