

4髄膜炎菌ワクチン
(ジフテリアトキソイド結合体)
Tetralvalent meningococcal vaccine
(Diphtheria toxoid conjugate)

●メナクトラ(サノフィ)

筋注：1/1バイアル0.5mL

[効]髄膜炎菌(血清型A,C,Y,W-135)

による感染の予防。

但し、血清型Bへの予防効果はない。

・ジフテリアへの予防効果はない。

[用] a.1回0.5mLを筋肉内接種。

b.2歳未満には未承認。

[禁] ジフテリアトキソイドによる
アナフィラキシー歴に禁忌。

[慎] a.血小板減少症又は出血障害。

b.ギラン・バレー症候群歴。

c.ジフテリアトキソイド・アレルギーに注意。

[注] ワクチン接種直後又は接種後に

血管迷走神経反射として失神→

転倒回避のため、30分程度は座らせる。

[禁][慎][注] その他は共通 →181頁

[副] A.重大：a.ショック、アナフィラキシー

b.急性散在性脳脊髄炎(ADEM)

c.ギラン・バレー症候群

d.横断性脊髄炎

e.けいれん

D. 蕁麻疹、発疹、そう痒 ●疼痛30%、紅斑(発赤)、腫脹、熱感、硬結、感覚鈍麻、●筋肉痛24%、筋力低下、関節痛、低血圧、●倦怠感15%、●頭痛11%、発熱、疲労、悪寒、傾眠、易刺激性、めまい、異常号泣、錯感覚、血管迷走神経性失神、顔面神経麻痺、湿疹、下痢、嘔吐、食欲不振、喘鳴、呼吸困難、上気道腫脹、