

TFV(TDF)
 テノホビル ジソプロキシルフマル酸
 Tenofovir disoproxil

【警告】B型肝炎の場合：

中止で再燃に注意

→投与後数ヵ月以上は

臨床症状・臨床検査値の観察

→患者の服薬不遵守に注意.

【特】a.投与24週で腰椎,72週で大腿骨の
 骨密度低下が発現:異常には中止.

b.高脂肪食で吸収増.

c.体脂肪の再分布・蓄積がある.

【効A】●**ベリアード**:(日本たばこ,鳥居)
 錠300mg

HIV感染症→169頁

【効B】●**テノゼット**(GSK)錠:300mg

B型肝炎ウイルスの増殖を伴い

肝機能の異常が確認された

B型慢性肝疾患における

B型肝炎ウイルスの増殖抑制.

a.投与開始前に,HBV-DNA量から
 ウイルスの増殖を確認.

b.B型慢性肝疾患治療ガイドライン:
 未治療の第一選択薬である

エンテカビル(ETV)の代替薬.

c.ラミブジン,アデホビルの多剤耐性
 例などでウイルス量制御に有用.

【用】a.1日1回 300mg.

Ccr<50 2日に1回1錠,<30 1週に2回.

血液透析患者 1週に1回1錠,又は

透析で累積12時間後に1錠.

【注】1.投与前にHIV感染の有無を確認.

2.HIV/HBV重複感染では薬剤耐性HIV

が出現→本剤のみの投与は回避.

【真】非代償性肝硬変.

【体内動態】半減期 17時間.

【併】B.慎:a.ATV300mgは血中濃度

40%減のため→RTV100mgを併用.

b.ATV,RTV,TFV併用時は食中～食直後
 に服用.

RTVなしにTFVは用いない.

c.ddl,アシクロビル類の血中濃度上昇.

【副】A.重大:a.重度の腎機能障害,腎不全.

b.乳酸アシドーシス,膵炎.