

976頁

●ラコール(大塚)：1kcal/mL,1kcal/g.

配合経腸用液・NF配合経腸用液：

- ・200mL(ミルク,バナナ,コーヒー,
コーン)400mL(ミルク).

NF配合経腸用半固形剤：

- ・微褐白色のゲル,わずかに特有の
香り(ミルク様),味はわずかに甘い.
- ・用液に添加物を加え半固形状に
→胃が本来有する貯留,排出機能を
発揮,誤嚥性肺炎,下痢を
予防,短時間で投与可能.

NF配合経腸用液・半固形剤：

ワルファリンの作用減弱防止の
ため,ビタミンK1を約1/10に減量.

[特]a.ω3系脂肪酸,アルギニン含有.

- b.牛乳アレルギーに禁忌.
- c.半固形剤は胃の機能が残存しない
場合は禁忌.

[用]a.液・経管：初め1日400mLを倍に
希釈し,毎時100mLで投与.

3~7日で標準量1日1200~2000mLとし,
毎時75~125mL,1日12~24時間で.

b.半固形・経管：1日1,200~2,000gを胃
内に1日数回に分けて2~3分/100gの
速度で投与,1回の最大投与量は600g.
初めの投与は数日で標準量へと増量.

[患]患者用説明書がある.

[使用期限]

液：a.加温は未開封のまま70℃以下.

- b.開封24時間以内に投与完了.

半固形剤：a.投与間隔は2時間以上.

- b.加温は未開封のまま湯煎
(40℃以下)にて短時間で.