

ツロクトコグ a Turoctocog a

●ノボエイト(ノボノルディスク)

静注用: 250,500,1000,1500,2000,3000IU

[特]自己注射できる。

[効]血液凝固第Ⅷ因子欠乏患者における出血傾向の抑制。

[用]a.生食4mLで溶解後1~2mL/分で緩徐に静注。

1回10~30IU/kgで適宜増減。

定期的投与: 20~40IU/kgを隔日又は

20~50IU/kgを週3回,12歳未満には

25~50IU/kgを隔日,又は25~60IU/kg

を週3回投与。

b.活性1IUは健常人の活性/血漿1mLに相当。必要量は次式より。

必要な単位(IU)=体重(kg)×第Ⅷ因子の目標上昇値(%又はIU/dL)×0.5(IU/kg/IU/dL)

c.出血エピソード及び外科手術に

おける用量の指標→添付文書参照。

[体内動態]半減期は≥12歳で12.6時間,

12歳>で8時間,6歳>で7.6時間。

[副] 7%]A.重大: ショック,アナフィラキシー。

D. 発疹,肝酵素(ALT,AST等)上昇,高血圧,心拍数増加,洞頻脈,めまい,頭痛,不眠症,筋骨格硬直,注射部位反応(紅斑等),浮腫,発熱,疲労,熱感。

[使用期限]溶解後は直ちに使用。

[保存]a.溶解後2~8°Cで保存

→24時間以内に使用

b.30°C以下で保存→4時間以内に使用

(4時間超えでは分解物を確認)

c.在宅では,冷蔵庫内保存が基本,

室温(30°C以下)保存も可→6ヵ月

以内に使用し,冷蔵庫に戻さない。