

## e.血友病B用薬

ノナコグ ガンマ Nonacog gamma

## ●リクスピス(バクスアルタ)

静注用：500u,1000u,2000u,3000u.

添付溶解注射水(5mL)

[特]a.ヒト及び動物由来タンパク質を使用しない遺伝子組換え製剤.

b.溶解手順はフィルター一体型デバイス.

[効]血液凝固第IX因子欠乏患者における出血傾向の抑制

[用]添付の注射用水5mLで溶解.

a.1回50u/kgを10mL/分以下で静注.

適宜増減.

・定期的投与：週2回投与40～75u/kg  
(12歳未満は40～80u/kg).

・出血時：必要量=体重(kg)

x第IX因子の目標上昇値(%又はu/dL)

x補正回収率の逆数

(1.1/12歳未満1.4)[(u/kg)/(u/dL)]

b.出血時又は周期での投与量及び投与頻度、治療期間の目安は添付文書参照.

[体内動態]半減期は27時間

(12歳未満では24時間)

[使用期限]溶解後は冷蔵せず

30℃以下で保存,3時間まで.

[保存期限]製造日より24カ月

[慎]肝疾患,術後,新生児,血栓塞栓性事象

のリスク,線維素溶解の徴候,DICは

→血栓塞栓性のリスク.

[注]1.インヒビターの発生に注意.

→アナフィラキシーのリスク増.

→止血効果低減.

→回収率,インヒビターを検査.

2.在宅自己注射は医師の管理下で行う.

[患]1.授乳は中止.

[副]5%A.重大(類薬)：

a.ショック,アナフィラキシー,

b.血栓塞栓症.

D.抗ファブリン抗体陽性,出血性貧血,四肢痛,味覚異常.