

g. 血液凝固第Ⅷ因子

遺伝子組換え血液凝固第Ⅷ因子

オクトコグ ベータ Octocog Beta

●コバルトリイ(バイエル)

静注用：250IU,500IU,1000IU/2.5mL  
2000IU,3000u/5mL

[特] 全ての動物とヒト由来の添加物が除去された。

[効] 血液凝固第Ⅷ因子欠乏患者における出血傾向の抑制

[用] 添付の注射水全量で溶解し

1回10～30IU/kgを緩徐に静注。  
(5mL/分以下：チアノーゼ,動悸)  
適宜増減。

定期投与：20～40IU/kgを週2～3回

12歳以下は25～50/kgを週2回,  
週3回又は隔日。

[注] インヒビターの発生に注意。

[体内動態] 半減期は12時間

12歳未満は11時間。

[使用期限] 溶解後：30℃以下で3時間。

[有効期間] 250IU/500IU：1年8ヵ月

1000IU：1年11ヵ月

2000IU/3000IU：1年9ヵ月

[副 5%] **A重大**：ショック,アナフィラキシー

**D**。そう痒,潮紅,アレルギー性皮膚炎,

蕁麻疹,発疹,頭痛,味覚異常,めまい,不

眠,動悸,洞性頻脈,腹痛,腹部不快感,消

化不良,リンパ節腫脹,発熱,胸部不快

感,注射部位：疼痛,そう痒。