

C. 腔錠,腔坐剤

プロゲステロン Ramelteon

●ルテムム(あすか)

腔用坐剤：400mg

[特]a.筋注製剤(ルテムム注)の外用薬.

b.患者自身の投与で通院回数が減.

注射に比べ時間的,身体的負担軽減.

c.投与アプリケーション不要.

[効] 生殖補助医療における黄体補充

[用]1回400mgを1日2回,

採卵日(又はホルモン補充周期下での凍結胚移植ではエストロゲン投与により子宮内膜が十分な厚さになった時点)から最長10週間(又は妊娠12週まで)腔内に投与する.

[禁,慎,注,併,患]→ルティナス参照

[患]一度溶けた場合に品質が劣化

→涼しい場所(25℃以下)で保管し,

一度溶けた製剤は使用しない.

[副] 19%] A.重大：血栓症(心筋梗塞,脳血管障害,動脈又は静脈の血栓塞栓症(静脈血栓塞栓症又は肺塞栓症),血栓性静脈炎,網膜血栓症),

D.●不正子宮出血11%,●外陰腔そう痒症7%,絨毛膜下血腫,切迫流産,外陰部腔カンジダ症,稽留流産,自然流産,骨盤痛,卵巣腫大,乳房圧痛,乳房痛,乳房不快感,傾眠,頭痛,浮動性めまい,味覚異常,気分動揺,気分変化,下腹部痛,腹痛,腹部不快感,腹部膨満,放屁,上腹部痛,便秘,下痢,嘔吐,胃拡張,発疹,そう痒症,適用部位そう痒感,不快感,疲労,冷感,体温変動感,寝汗,体重増加,関節痛,直腸新生物,失禁,頻尿,ほてり.