

トレラグリブチンコハク酸塩
Trelagliptin Succinate

●ザファテック(武田)

錠：50mg,100mg

[効]2型糖尿病

但し,食事療法・運動療法で
効果不十分に限る。

2~3か月投与で無効は中止。

[用]a.100mgを週1回(同じ曜日)。

b.中等度腎機能障害：50mgを週1回

男性(女性)：1.4(1.2)<Cr≤2.4(2.0)
30≤Ccr<50。

c.飲み忘れ→気付いた時に1回量服用。

→以後,決められた曜日に服用。

[注]a.中止後も作用持続する

→血糖値,副作用に注意。

b.中止後に他の糖尿病用薬を使用

→投与開始時期,用量を検討。

c.DPP-4阻害剤(1日1回)から本剤への

変更でHbA1c値に変化なし。

[体内動態]a.ピークは1.3時間,

半減期(0~7日)54時間。

尿中排泄率76%。

b.腎機能障害でのAUC増加%

軽度 55.7 中等度 105.7

高度 201.4 末期腎不全 268.1

c.主にCYP2D6でN-脱メチル化により

活性代謝物M-IIに代謝。

d.P-糖蛋白質の基質,OCT2を阻害。

e.食事の影響少ない。

[副]A重大：低血糖。SU剤と併用→

SU剤の減量。(類薬)急性膵炎,腸閉塞。

D.そう痒,心房細動,ALT↑,AST↑,γ-G

TP↑,血中アミラーゼ↑,リパーゼ↑,

CK(CPK)↑,尿潜血陽性,鼻咽頭炎。