

E.核酸型NS5B ポリメラーゼ阻害薬

- ソホスブビル Sofosbuvir
●ソバルディ (ギリアド・サイエンシズ)
錠：400mg,(1瓶28錠)
20×9×7mm,重量1236mg,
[特]a.リバビリンと併用で12週内服
(インターフェロンなし)
b.肝臓で活性代謝物となり
RNA鎖の伸張を阻害する
c.活性代謝物は血中に検出されない。
不活性型代謝物が血中に出現
[効]セログループ2(ジェノタイプC型)
慢性肝炎又はC型代償性肝硬変
におけるウイルス血症の改善。
a.HCV RNA陽性であること。
b.非代償性肝硬変でないこと
[用]リバビリンと併用する：
1日1回400mgを12週間内服。
リバビリン中止時は本剤も中止。
b.リバビリンは添付文書,653頁参照。
[体内動態]a.未変化体のピークは
0.5時間,半減期0.4時間
b.食後投与でピーク延長。
c.未変化体の尿中排泄率は2.6%。
[禁]1.重度の腎機能障害(eGFR<30)
又は透析の腎不全。
・腎機能正常に比して軽度,中等度,
重度,末期腎不全で透析後で夫々
AUCは161%,207%,271,160%。
[警],[禁],[慎],[注],[副]
→リバビリンを必ず確認。
[患]1.妊婦→リバビリン参照。
2.授乳中は投与禁,投与時は授乳中止。
[併]P-gp,BCRPの基質。
A.禁：リファンピシン,カルバマゼピン,
フェニトイン,セイヨウオトギリソウ
で本剤(未変化体)の血漿中濃度が低下。
B.慎：リファブチン,フェノバルビ
タールで本剤の血漿中濃度が低下。
[副]43%A.重大：
●貧血11%→リバビリン。
D. 鼻咽頭炎,うつ,不眠,●頭痛5%,傾
眠,めまい,注意力障害,高血圧,呼吸困
難,咳,悪心,便秘,口内炎,腹部不快感,下
痢,口唇炎,消化不良,高ビリルビン血
症,そう痒,発疹,脱毛,皮膚乾燥,筋肉痛,
関節痛,背部痛,筋痙縮,倦怠感,疲労,易
刺激性,発熱,無力症。